

# 鼻腔むくみづまりに

# ムクノーズ錠

## 効能・効果

体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症：気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症

## 成分・分量 1日量(12錠)中

小青竜湯エキス(1/2量) 2.5g

ハング3.0g、カンゾウ・ケイヒ・ゴミシ・サイシン・ジャクヤク・マオウ・ショウキョウ各1.5g  
より抽出

添加物として、CMC-Ca、水酸化Al/Mg、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、セルロースを含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります

## 用法・用量 次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	4錠	1日3回
7才以上15才未満	3錠	
5才以上7才未満	2錠	
5才未満	× 服用しないこと	

### <用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法・用量を厳守すること
  - 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- 食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます



小林製薬

第2類医薬品

36錠  
3日分(15才以上)

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください  
使用期限(パウチ下部に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

漢方製剤  
第2類医薬品

販売名:ムクノーズ

## ⚠ 使用上の注意

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4)胃腸の弱い人 (5)発汗傾向の著しい人 (6)高齢者 (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (8)次の症状のある人:むくみ、排尿困難 (9)次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

まれに下記の重篤な症状が起こることがある  
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

- 1ヶ月位(感冒に服用する場合には5～6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりとめて保管すること
- 小児の手の届かない所に保管すること
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- 本剤をぬれた手で扱わないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお問い合わせください

発売元 小林製薬株式会社 製造販売元 小林製薬株式会社  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10 〒567-0057 大阪府茨木市豊川3-30-3

小林製薬 お客様相談室  
0120-5884-01  
9:00～17:00(土・日・祝日も除く)



MADE IN JAPAN