

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

ファイチ Beautiol

販売名：ファイチBeautiol

第2類医薬品

貧血用薬

製品特徴

- ① 溶性ピロリン酸第二鉄を主成分とし、効果的にヘモグロビンを造り、貧血を改善する貧血用薬
- ② 赤血球を造るのに必要な葉酸とビタミンB₁₂や血行促進成分であるビタミンE、鉄分の吸収を高めるビタミンCを有効成分として含有
- ③ コーティング錠だから、鉄の味やニオイがしない
- ④ 腸で溶ける錠剤だから、効果的に成分を体内に吸収
- ⑤ 1日1回の服用で効く

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと

他の貧血用薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

効能・効果

貧血

用法・用量

次の量を食後に水又はお湯で服用してください

年 齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	2錠	1日1回
15才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守すること
- (2)服用の前後30分はお茶・コーヒー等を飲まないこと
- 本品はかまずに服用すること

成分・分量

1日量(2錠)中

溶性ピロリン酸第二鉄	79.5mg
アスコルビン酸(ビタミンC)	50.0mg
酢酸d- α -トコフェロール(ビタミンE)	10.0mg
シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)	50 μ g
葉酸	1.0mg

添加物として、トウモロコシデンプン、二酸化ケイ素、ラウリン酸ソルビタン、ゼラチン、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、セルロース、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、ヒプロメロースフタル酸エステル、ヒプロメロース、マクロゴール、赤色102号、黄色5号を含有する

<成分・分量に関連する注意>

- 尿及び便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください
- 配合されている溶性ピロリン酸第二鉄により、便が黒くなることがあります

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2)小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

<錠剤の取り出し方>

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる)



製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元
全薬工業株式会社
東京都文京区大塚5-6-15