

使用前にこの箱の説明文書を必ず
お読み下さい。また、必要な時に
読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痛消炎薬 要指導医薬品 **7枚入**
ロキソニンSテープ (7枚×1袋)

特
徴

すぐれた鎮痛消炎効果をもつ【ロキソプロフェンナトリウム水和物】を配合。

肌から吸収されると活性型に変化、
つらい痛みの芯まで直接浸透してしっかり効く。

1日1回使用。貼り心地がよく、
すぐれた伸縮性ではがれにくい。



使用上の注意

× してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないで下さい。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用し**てぜんそくを起こしたことがある人**
 - (3) 15歳未満の小児
- 次の部位には使用しないで下さい。
 - (1) 目の周囲、粘膜等
 - (2) しっしん、かぶれ、傷口
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部
- 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないで下さい。
- 連続して2週間以上使用しないで下さい。(本剤は痛みを一時におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診療を受けて下さい)



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などにアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (4) 高齢者
 - (5) 次の診断を受けた人 気管支ぜんそく

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる、色素沈着
消 化 器	胃部不快感、みぞおちの痛み
そ の 他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすけ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 3.使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
下痢・軟便
- 4.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
(他の疾患の可能性があります)

効 能 ・ 効 果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用 法 ・ 用 量

表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用して下さい。
- (3) 1日あたり4枚を超えて使用しないで下さい。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用して下さい。
- (5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめしてから使用して下さい。

成分・分量(膏体100g中)

ロキソプロフェンナトリウム水和物 5.67g(無水物として5g)
添加物: スチレン・イソブレン・スチレンブロックポリマー、ポリイソブチレン、水添ジシクリセリンエステル、BHT、トメントール、流動パラフィン、その他2成分
[1枚あたり(7cm×10cm)膏体量1g]

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャックをきちんと閉めて保管して下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daichisankanyo-hc.co.jp/>

販売元

04 登録商標

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

リードケミカル株式会社

富山県富山市日俣77-3

MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

