

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痛消炎薬 第2類医薬品

ロキソニンEXテープ

特徴

すぐれた鎮痛消炎効果をもつ [ロキソプロフェンナトリウム水和物] を8.1%配合。

さらに2つの有効成分を追加配合。  
つらい痛みの芯まで直接浸透してしっかり効く。

1日1回使用。こだわりの薄型設計で、  
貼り心地やはがれにくさを追求。

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人 (3) 15歳未満の小児
2. 次の部位には使用しないで下さい。
  - (1) 目の周囲、粘膜炎等
  - (2) しゃっしん、かぶれ、傷口
  - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないで下さい。
4. 連続して2週間以上使用しないで下さい。(本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、医師の診察を受けて下さい)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありま  
すので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師  
又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ、 水疱、青あざができる、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は  
直ちに医師の診察を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、 声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、 息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このよう  
な症状の持続又は増強が見られる場合には、使用を中止し、この  
外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
下痢・軟便
4. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、  
この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
(他の疾患の可能性がありま)

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 高齢者
  - (5) 次の診断を受けた人 気管支ぜんそく

効能・効果

腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・首  
の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

表面のライナー(フィルム)をはがし、1日1回患部に貼付して下さい。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、  
痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ  
使用して下さい。
- (3) 1日あたり4枚を超えて使用しないで下さい。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用して下さい。
- (5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の  
小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状  
が起きないことを確かめてから使用して下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手が届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ  
替えない下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャック  
をきちんと閉めて保管して下さい。(5) 表示の使用期限を過ぎた  
製品は使用しないで下さい。また、アルミ袋を開封した後は、なるべく  
早く使用して下さい。

成分・分量(膏体100g中)

成分	分量	はたらき
ロキソプロフェン ナトリウム水和物	8.10g (無水物として7.14g)	炎症や痛みのもと【プロスタ グランジン】をおさえます。
トコフェロール酢酸 エステル	2.3g	患部の血行を促進し、痛みを やわらげます。
l-メントール	3.5g	清涼感を与え、痛みをやわらげます。

添加物: スチレン・イソブレン、ステレンプロックポリマー、ポリイソブ  
レン、水添ロジンジリセリンエステル、BHT、ステアリン酸亜鉛、流動パラ  
フィン、その他3成分 [1枚あたり(7cm×10cm)膏体量0.7g]

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。  
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒1103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10  
電話 0120-337-336 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

販売元 01®登録商標  
第一三共ヘルスケア株式会社  
東京都中央区日本橋3-14-10  
製造販売元  
リードケミカル株式会社  
富山県富山市日僕77-3

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931  
MADE IN JAPAN