

服用に際して、パッケージ又はラベルの説明文をよくお読みください。

生薬配合胃腸薬

第2類医薬品

# ソルマック<sup>®</sup> PLUS

## SOLMACK PLUS

### ⚠ 使用上の注意

#### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 長期連用しないで下さい。



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 高齢者 (3) むくみのある人  
(4) 高血圧、腎臓病、心臓病の診断を受けた人
2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けて下さい。  
偽アルドステロン症、ミオパチー（手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。）
3. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

### 効能・効果

はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、恶心)、嘔吐、消化不良、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、もたれ(胃もたれ)、胃弱、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胸つかえ

### 用法・用量

成人(15歳以上)、1回1本(25mL)を1日2回服用して下さい。

服用間隔は4時間以上おいて下さい。

- 小児(15歳未満)は服用しないで下さい。

- 用法・用量を厳守して下さい。

### 成 分

ウコン流エキス	0.3mL (原生薬300mgに相当)
カンゾウ抽出物	135mg (原生薬1930.5mgに相当)
ニンジン流エキス	0.5mL (原生薬500mgに相当)
オウレンチンキ	0.826mL (原生薬247.8mgに相当)
チョウジチンキ	0.126mL (原生薬37.8mgに相当)
ゲンチアナチンキ	0.376mL (原生薬112.8mgに相当)
ソウジュツ流エキス	1.2mL (原生薬1200mgに相当)
ケイヒチンキ	0.25mL (原生薬75mgに相当)
カルニチン塩化物	120mg

添加物：ハチミツ、白糖、アラビアゴム、エデト酸Ca/2Na、L-メントール、アルコール、安息香酸Na、pH調整剤、安息香酸ベンジル、香料

(アルコール0.8mL以下/本)

- 生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。

### **保管及び取扱い上の注意**

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

### **包 裝**

1箱2本(25mL×2本)入り

1箱5本(25mL×5本)入り

●上記の内容はパッケージ又はラベルに表示しております。

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

TEL 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元



**大鵬薬品工業株式会社**

東京都千代田区神田錦町1-27

お客様相談室 TEL.03-3293-4509

受付時間:9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

<https://www.taiho.co.jp/>

® : 登録商標