

[効能] ●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給 ●滋養強壮 ●虚弱体質

[用法・用量] 15歳以上は1日1回1ビン(50mL)を服用してください

●用法・用量を守ること(他のビタミン等を含む製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること)

金属
:キャップ
ガラス:瓶

50mL



4

[成分] 1ビン(50mL)中
フルスルチアミン塩酸塩
(ビタミンB₁誘導体)
..... 3mg

リボフラビン
リン酸エステルナトリウム
(ビタミンB₂リン酸エステル)
..... 2.54mg

ピリドキシン塩酸塩
(ビタミンB₆) 10mg
L-バリン 80mg
L-ロイシン 160mg
L-イソロイシン 80mg
カルニチン塩化物
..... 50mg

添加物:ステビア抽出精製物、エリスリトール、アセスルファムカリウム、スクラロース、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、没食子酸プロピル、安息香酸Na、香料、エタノール、バニリン、プロピレングリコール

★本剤の服用により尿が黄色くなる場合がありますが、リボフラビンリン酸エステルナトリウムによるものなので心配ありません



タケダ

夜もおすすめ、
ノンカフェイン
アリナミン[®]
R-Off

フルスルチアミン+BCAA
(バリン・ロイシン・イソロイシン) 配合

糖類ゼロ

2kcal/本

製造販売元

武田薬品工業株式会社

大阪府中央区道修町四丁目1番1号

アリナミン[®]R オフ

服用に際して、ビンの表示を必ず読むこと

[使用上の注意] **相談すること**

- 次の場合は、直ちに服用を中止し、このビンを持って医師または薬剤師に相談すること
 - 1.服用後、次の症状があらわれた場合
皮膚:発疹、消化器:胃部不快感
 - 2.しばらく服用しても症状がよくなる場合
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること 下痢

[保管および取扱い上の注意]

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること
- 小児の手のとどかない所に保管すること
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

お客様相談室 ☎ 0120-567087
9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

指定医薬部外品

使用期限

製造番号

タケダ健康モバイルサイト
<http://tkdm.jp>

A12LC D1