

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



90721

紫外線等による目の炎症・充血に

バイシン<sup>®</sup>UV  
Visine<sup>®</sup> UV

〈目薬〉

第2類医薬品

バイシンUVは、「硫酸亜鉛水和物」の収れん作用により、傷ついた組織の回復を促進し、紫外線などによる炎症を効果的に改善。「コンドロイチン硫酸エステルナトリウム」が紫外線を浴びた角膜の表面を保護します。また充血クリア成分「塩酸テトラヒドロソリン」配合で、紫外線による炎症等で起こってしまった充血にも効果的です。



## 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3) 次の症状のある人。  
はげしい目の痛み  
(4) 次の診断を受けた人。  
緑内障
  - 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |
| 目    | 充血、かゆみ、はれ |
- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 目のかすみ改善されない場合。  
(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

### 【効能・効果】

紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、結膜充血、目の疲れ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

### 【用法・用量】

1回1～3滴を1日3～6回点眼してください。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- ソフトコンタクトレンズ及びO<sub>2</sub>コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- 点眼用에만使用してください。

## 【成分・分量】


パイシンUV 10mL中の成分、分量及びその主なはたらきは次のとおりです。

成分	分量	はたらき
塩酸テトラヒドロソリン	5mg	末梢血管収縮作用により、結膜の充血を取り除きます。
硫酸亜鉛水和物	15mg	収れん作用により目の炎症をおさえます。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	50mg	傷ついた目の組織を回復し角膜を保護します。

添加物として、クエン酸 Na、ホウ酸、ベンザルコニウム塩化物液、クロロブタノール、エデト酸 Na、プロピレングリコール、グリセリン、ポリソルベート 80、ℓ-メントール、d-ボルネオール、ゲラニオール、pH 調整剤、等張化剤を含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】


- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に自動車等、高温になる所に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないでください。



## 【包装】

パイシンUV：10mL

### キャップシールの開け方



矢印のところからキャップシールをはがし(①)、ミシン目にそって矢印の方向にキャップシールを取り去ってください(②)。シールの切れ端が残った場合には、それを切り取ってからご使用ください。製品本体部のシールを破らないようにご注意ください。

**お願い：**パイシンUVは安全キャップシールを採用しています。

万一、シールがはがれている場合は、ご使用にならないようお願い申し上げます。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」

〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

**ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社**

〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-2

販売元

**武田薬品工業株式会社**

〒540-8645 大阪府中央区道修町四丁目1番1号

© J&J KK 2012

登録商標

1EB

90721