

この添付文書は、本剤の服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品



肉菘菘



海馬

NAN PAO®

腰痛・肩こりに
疲労倦怠感を伴う

生薬製剤
ナンパオ®

生薬三十種配合



茯苓



人參

健康のためには日頃から体調に気を配り、早めに手当することが大切です。多くの生薬には自然治癒力を高めるはたらきがあり、その生薬をうまく組み合わせることによって、より効果が発揮されます。

ナンパオは31種類の身体に優しい生薬を、当社の技術で製品化した、のみやすいカプセル剤です。

歳を重ねるにつれ腰痛・肩こりを伴い、疲れ・だるさの抜けない人にきめ細かな効果をもたらします。



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

のぼせが強く赤ら顔で体力が充実している人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 下痢しやすい人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	下痢、便秘、吐き気、嘔吐、胃部不快感、胃痛、腹痛
* その他	のぼせ、ほてり、動悸、めまい、頭痛、気分が悪くなる、 口唇・舌のしびれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、 全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



効能

中年期以降における疲労倦怠感を伴う腰痛・肩こり

用法・用量

次の量を食後約30分以内に、水またはお湯と一緒にかまずに服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人	2カプセル	朝晩2回
15才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) カプセルの取り出し方

○「シート包装」の場合は、右図のようにカプセルの入っているシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

(誤ってシートごとのみ込んだりすると、シートが食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる可能性があります。)

○「ビン包装」は上記の操作は必要ありません。



成分 (4カプセル中)

ロクジョウ (鹿茸).....	67 mg	ボタンピ (牡丹皮).....	33 mg
コウクジン (広狗腎).....	53 mg	カイバ (海馬).....	67 mg
コクロジン (黒驢腎).....	235 mg	トチュウ (杜仲).....	67 mg
トウキ (当帰).....	133 mg	アキョウ (阿膠).....	67 mg
ニンジン (人参).....	133 mg	ケイヒ (桂皮).....	53 mg
次の生薬よりなる水性エキス.....			818 mg
センボウ (仙茅).....	67 mg	ホウブシ (炮附子).....	67 mg
トシシ (菟絲子).....	67 mg	クコシ (枸杞子).....	133 mg
ホコツシ (補骨脂).....	67 mg	ゲンジン (玄参).....	67 mg
インヨウカク (淫羊藿).....	133 mg	オウギ (黄耆).....	133 mg
コロハ (胡蘆巴).....	67 mg	ビャクジュツ (白朮).....	67 mg
ハゲキテン (巴戟天).....	67 mg	サンシュユ (山茱萸).....	67 mg
ニクジュヨウ (肉蓯蓉).....	67 mg	ブクリョウ (茯苓).....	133 mg
サヨウ (鎖陽).....	67 mg	バクモンドウ (麦門冬).....	67 mg
センゾクダン (川続断).....	33 mg	ゴシツ (牛膝).....	33 mg
ジュクジオウ (熟地黄).....	133 mg	カンゾウ (甘草).....	33 mg
フクボンシ (覆盆子).....	67 mg		

添加物：ゼラチン、赤色3号、黄色5号、青色1号、ラウリル硫酸Na、亜硫酸水素Na、トウモロコシデンプン、香料

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) ビン包装の製品は服用のつどフタをよくしめてください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



製造販売元
田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区北浜2-6-18



提携
天津力生製薬股份有限公司
中国天津市南開区黄河道491号

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店
又は下記にお願いいたします。
田辺三菱製薬「くすり相談センター」
(フリーダイヤル ☎0120-54-7080)
受付時間：弊社営業日の9:00～17:30

ホームページ www.mt-pharma.co.jp