★2012年12月改訂（配載要領変更に伴う改訂）

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。

第3類医薬品

コンタクトレンズ装着時の不快感、目のかわきに

ルイビーCL 目薬 15mL

ルイビーCLは液状タイプの目薬でコンタクトレンズを装着しているときの不快感を取り除きます。ソフト・O₂・ハード・使い捨て等、どんなコンタクトレンズをつけたままでも点眼できます。目のかわき、目の疲れ、目のかすみにも効果を現します。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1．次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)次の症状のある人。
はげしい目の痛み
(4)次の診断を受けた人。
緑内障

2．使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症　　状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3．次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)目のかすみが改善されない場合
(2)2週間位使用しても症状がよくならない場合

（効能・効果）

目の疲れ、保護の補助（目のかわき）、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ（目やにの多いときなど）

コンタクトレンズの不快感

目のかわき、目の疲れ

（用法・用量）

1回2－3滴、1日3－6回点眼してください。

〔用法・用量に関連する注意〕

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(2)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
容器の先がまぶたやまつ毛に触れますと、目やにや睫毛等のため、薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。
(3)保存状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側に白く付着することがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとって使用してください。
(4)本剤は点眼用にのみ使用してください。

正しい点眼方法

〔成分・分量〕

本剤は無色透明な液体で、100mL中に次の成分を含有します。

塩化ナトリウム　550mg
塩化カリウム　150mg

添加物：ホウ酸、ホウ砂、エデト酸ナトリウム水和物、ポリソルベート80、クロルヘキシジングルコン酸塩、ヒドロキシエチルセルロース

〔保管及び取り扱い上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わります。）。
(4)他の人と共用しないでください。
(5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後は速やかに使用してください。
(6)自動車の中や暖房器具の近く等、高温（40℃以上）の所に置かないでください（容器が変形することがあります。）。

〔お客様相談窓口〕

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局、薬店または下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

キョーリンリメディオ株式会社　学術部
〒920-0017　金沢市諸江町下丁287番地1
[redacted] (0120-960189
受付時間　9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

発　売　元
キョーリンリメディオ株式会社
富山県富山市芝園町3丁目1番地

製造販売元
日東メディック株式会社
富山県富山市八尾町保内1－14－1

2021