

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

指定医薬部外品

角質剥離剤

NICHIBAN

スピール膏TM CX

SPJ6L
SPJ6M
SPJ8S

スピール膏TM CXは、サリチル酸の角質軟化溶解作用を利用したバンデージタイプの角質剥離剤です。厚く硬くなった皮ふをやわらかくし、うおのめ、たこを取り去ります。又、保護用パッドにより患部を守り、外部からの刺激による痛みをやわらげます。

⚠ 使用上の注意

❌ [してはいけないこと]
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人には使用しないでください。

乳幼児（7歳未満）

2. 次の部位には使用しないでください。

① 目の周囲、粘膜、やわらかい皮ふ面（首の周り等）、顔面等
（角質溶解作用の強い薬剤ですからこのような部位には使用しないこと）

② 炎症又はキズ、化膿のある患部等
（炎症やキズ、化膿のある患部等に使用すると刺激が強く、症状を悪化させることがあります）

③ いぼ

 [相談すること]

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

① 本人又は家族がアレルギー体質の人

② 薬などによりアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人

③ 妊婦又は妊娠していると思われる人
（サリチル酸の内服による動物実験で、胎児の奇形を起こす作用が報告されています）

④ 授乳婦

⑤ 糖尿病の治療を受けている人
（糖尿病の方は感染抵抗力が低下しています。角質を取る際に皮ふを傷つけてしまった場合、感染しやすくなります）

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

3. 1カ月程度使用しても症状の改善が見られない場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

[その他の注意]

本品や固定用テープ等をはがす時は、皮ふを傷めないように体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

【効能・効果】

うおのめ、たこ

【用法・用量】

本品を台紙からはがし、薬剤部分を患部にズレないように貼り、2～3日毎に新しい薬剤付パッドと交換してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

① 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

② 本品は外用にのみ使用し、内服しないでください。

③ 緑色の薬剤部分が健康な皮ふに付着すると、その部分も白く軟化し、痛んだりしますので、患部の周りの皮ふにつかないようによく注意して使用してください。

★裏面の〈スピール膏TM CXの上手な使用例〉をご覧ください。

④ 固定用テープをお使いの際には、皮ふかぶれやテープのはがれをさけるため、テープを伸ばさずにお貼りください。

【成分・分量】

成分（1cm²中）：サリチル酸……………45mg（サリチル酸50%配合）
添加物として、生ゴム、中鎖脂肪酸トリグリセリド、水素添加ロジングリセリンエステル、精製ラノリン、銅クロロフィリンナトリウム、その他1成分を含有する。

【保管及び取り扱い上の注意】

① 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。

② 小児の手のとどかない所に保管してください。

③ 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。


④ 開封後、残った薬剤付パッド（スピール膏TM CX）及び固定用テープ類は、品質保持のため、それぞれもとの袋に戻しもとの箱に入れて保管してください。

【包装】

- | | | |
|-------------------------|---------------------|-----|
| ●スピール膏 TM CX | Lサイズ(薬剤部分直径 10mm) | 6枚 |
| 固定用テープ | 12mm×60mm・30mm×40mm | 各6枚 |
| ●スピール膏 TM CX | Mサイズ(薬剤部分直径 7mm) | 6枚 |
| 固定用テープ | 12mm×60mm・30mm×40mm | 各6枚 |
| ●スピール膏 TM CX | Sサイズ(薬剤部分直径 5mm) | 8枚 |
| 固定用テープ | 12mm×60mm・30mm×40mm | 各8枚 |

【形状】

〈薬剤付パッド(本品)〉



〈スピール膏TMCXの上手な使用例〉

※患部をお湯に浸して軟らかくし、よく拭いてからご使用になると一層効果があります。

①薬剤部分を患部にあて、絆創膏部分でしっかりとめます。なお、ズれるような場合は、同封の固定用テープで十字型にとめ、2～3日間密着させておきます。入浴などの際にも貼ったまま密封するなどして、ぬれてはがれないように注意します。



②交換の際には白くなった角質部を消毒したピンセットなどで、痛みを感じない程度に取り除きます。

③患部が完全に取りきれない場合は新たに本品を貼り、繰り返し①～②を続けます。


④特にうおのめは、しん(角質柱)を完全に取り除かないと何度でも再発しますので、貼り換えの際には白くなった角質部を②の要領で取り除いた後、しんの部分に合わせて小さく切った薬剤をズレないように貼り、しんが取れるまで使用を続けます。

⑤うおのめ、たこを取った後、患部が陥没したり、角質が白く硬くなることがありますが、新しい皮ふが再生されますので、清潔にしておいてください。なお、患部が痛むようでしたら、救急絆創膏等を貼っておいてください。

TM:trademark



貼付例図 (うおのめ)



※本品を使用したまま入浴してもさしつかえありませんが、固定用テープでしっかり固定するなど、はがれないように注意してください。

- お問い合わせ先
ニチバン株式会社 お客様相談室
電話 0120-377-218
受付時間:9:00~12:00,13:00~16:00(土・日・祝日を除く)

ニチバン株式会社

〒102-8811 東京都千代田区麹町5-1