

コラーゲンづくり等を助ける  
4つのビタミン配合により、  
肌あれ・にきび・口内炎を内  
側から治します。ゼリーの錠  
剤ですから、水なしで、かん  
で服用できます。職場や学校で  
も手軽に服用していただける  
苦味のないグレープフルーツ  
味。低カロリー。

## 特長

1. 水あめやカンテンを原料とした、ゼリーで  
つくった錠剤ですから、水なしで、かんで  
服用できます。
2. 普通の錠剤を飲み込むのが苦手な方でも服  
用が簡単です。
3. お肌の真皮層を形成するコラーゲンづくり  
を助けるビタミンC、お肌や粘膜を正常な  
状態に保つビタミンB<sub>2</sub>・ビタミンB<sub>6</sub>配合  
により、肌あれ・にきび・口内炎を内側か  
ら治します。
4. 疲れの栄養補給にも効果的です。
5. 携帯しやすいアルミ袋包装。

### 使用上の注意

**相談すること** 1. 服用後、次の症状があらわれた  
場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中  
止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者  
に相談して下さい。

関係部位	症状
消化器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、  
このような症状の持続又は増強が見られた場合に  
は、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師  
又は登録販売者に相談して下さい。下痢  
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は  
服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は  
登録販売者に相談して下さい。

**【効能】** 次の諸症状の緩和：肌あれ、にきび、口  
内炎、口角炎、口唇炎、かぶれ、ただれ、湿疹、皮膚炎、  
舌炎、赤鼻、目の充血、目のかゆみ「ただし、これらの  
症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない  
場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。」

次の場合のビタミンB<sub>2</sub>の補給：肉体的疲労時、病中病  
後の体力低下時、妊娠・授乳期

**【用法・用量】** 7歳以上15歳未満1回1錠  
を1日2回（1日分7.5キロカロリー）、15  
歳以上1回2錠を1日2回（1日分15キロ  
カロリー）、朝夕にかんで服用して下さい。

### <用法・用量に関連する注意>

1. かんで服用して下さい。2. 定められた用法・用量  
をお守り下さい。3. 小児に服用させる場合には、保  
護者の指導監督のもとに服用させて下さい。


**【成分・分量】** 成人1日量4錠中

ビタミンC180mg、ビタミンB<sub>2</sub>酸エステル20mg、ビタミンB<sub>6</sub>12mg、  
ニコチン酸アミド（ビタミンの一種）40mg 添加物として水アメ、カ  
ンテン、白糖、ペクチン、エリスリトール、トコフェロール酢酸エステル、ポリ  
ソルベート80、香料、その他2成分を含みます。本剤の服用により、尿が黄  
色くなることがありますが、配合されているビタミンB<sub>2</sub>の一部が尿中に排  
泄されるため心配はありません。

**【保管及び取扱い上の注意】** 1. 錠剤を袋から取り出  
したらすぐに服用して下さい。2. 直射日光の当たらない  
涼しい所にチャックを閉じて保管して  
下さい。3. 他の容器に入れ替えない  
で下さい（誤用の原因になったり品質  
が変わることがあります）。4. 容器内  
に乾燥剤が入っています。誤って服用  
しないで下さい。5. 使用期限を過ぎ  
た商品、使用前に開封された形跡の  
ある商品は服用しないで下さい。6. 小  
児の手の届かない所に保管して下さい。

販売  
日本臓器製薬株式会社  
大阪市中央区平野町2丁目1番2号  
お客様相談窓口 ☎06-6222-0441  
土・日・祝日を除く 9:00~17:00

製造販売元  
大木製薬株式会社  
東京都千代田区神田鍛冶町3-3



4

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931

使用期限

製造番号



0402 ㊞登録商標 PE、金属、PET