

かぜのひきはじめに 熱・のどの痛み・せきの諸症状に 葛根湯エキス配合総合かぜ薬

コト顆粒



第②類医薬品

12包入
4日分

使用上の注意 ☒ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
1. 次の人は服用しないでください (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用して喘息を起こしたことがある人 (3) 12歳未満の小児 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮痙攣薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等 (消炎用内服薬、薬物酔い薬、アレルギー用薬等) 3. 服用後、眩暈等があらわれることがありますので、乗物又は機械類の運転操作をしないでください 4. 授乳中の人は本剤を服用しないが、本剤を服用する場合は授乳を控えてください 5. 服用前後は飲酒しないでください 6. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 高熱、排尿困難の症状のある人 (6) 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症の診断を受けた人 (右側面に続きが記載されています)
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

患部	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

3. 服用後、発熱、口のかわき、悪寒があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 4. 5-6回服用しても症状が改善しない場合は、医師の診断を受けてください

症状	注意
呼吸器	発熱、悪寒、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み、シビロコデインリン酸塩
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

第②類医薬品

コト顆粒

特徴

▼開け口

12包入 4日分

- かぜのひきはじめに、葛根湯エキスがかぜに伴う発熱、悪寒、頭痛、関節の痛み等の諸症状をやわらげます。
- アセトアミノフェンのはたらきにより、かぜに伴う発熱、悪寒、頭痛、関節の痛み等の諸症状をやわらげます。
- クロルフェニラミンマレイン酸塩のはたらきにより、鼻水・鼻づまり・くしゃみを抑え、シビロコデインリン酸塩のはたらきにより、せきをすめます。
- 12歳以上のお子様から大人まで服用できます。
- かぜに伴う発熱等によるビタミンC・B₂の消耗をおぎないます。

効能・効果

かぜの諸症状 (鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み) の緩和

用法・用量

成人 (15歳以上) 1回1包、12歳以上15歳未満1回2/3包、いずれも1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。

用法及び用量に関連する注意

(1) 服用に際しては、水又はぬるま湯と一緒に服用してください (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください



使用期限 製造番号
製造販売元 新生薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水台1269
お客さま相談窓口 ☎06-6222-0441
土・日・祭日及び当休日はを除く 9:00~17:00
副作用数報告制度 0120-149-931