

**温感 鎮痛消炎プラスター剤**  
**パスタイム H<sup>R</sup>**

第3類医薬品

パスタイム H は温感効果を発揮するノニル酸ワニリルアミドを配合し、肩こり、腰痛、筋肉痛等にすぐれた鎮痛消炎効果のある、ニオイをおさえた微香性プラスター剤です。

**【特長】**

ジワジワとした温感作用が持続し、痛みやこりにすぐれた効果をしめします。  
 皮ふから吸収された有効成分が、痛みやコリをおさえます。  
 肌色で薄く、目立たないので人前でも安心です。  
 ムレをおさえる気孔付きです。  
 伸縮性のある、肌にやさしいはり薬です。

**⚠ 【使用上の注意】**

**☒ してはいけないこと**

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]

**1. 次の部位には使用しないでください。**

(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口

**☒ 相談すること**

**1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

**2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み、皮ふはく離

**3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。**

**【効能・効果】** 肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、関節痛、骨折痛、しもやけ

**【用法・用量】** 1日数回患部に貼付してください。

**用法・用量に関する注意**

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) はった患部をコタツや電気毛布などで温めないでください。
- (3) 強い刺激を感じることがあるので、入浴の30分以上前にはがしてください。  
また、入浴後に貼る場合は30分位してからはってください。
- (4) 汗などをよくふき取り、患部をきれいにしてから使用してください。
- (5) 皮ふの弱い人は、同じところに続けてはらないでください。

**【成分・分量】** 膏体 100g 中

サリチル酸グリコール···	6.4g
/ - メントール···	1.9g
ノニル酸ワニリルアミド···	0.072g

添加物としてBHT、生ゴム、水素添加ロジングリセリンエステル、スチレン・イソブレン・スチレンプロック共重合体、ポリブテン、その他2成分を含有します。

**【保管及び取扱い上の注意】**

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. 開封後は袋の口を折りまげて保管し、早めに使用してください。
5. 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

**【包 装】** 7.5cm×9.0cm 20枚(10枚/袋×2袋), 30枚(10枚/袋×3袋)

製造販売元 ◎祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分 2596番地1

[お客様相談窓口] TEL.0954-63-1320

受付時間 9:00~17:00 (土,日,祝日は除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931