

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

目の疲れ・かすみに

ロートビタ40α

第3類医薬品

ロートビタ40 α

12mL

目薬

キャップのあけ方

キャップを手前にひねってください。



キャップのしめ方

カチッと音がするまでおし下げてください。



※容器全体を支えるように持ち、キャップを上にして開閉してください。

容器の中央部分だけを持って開閉すると、薬液がとびだしてもれることがあります。

使用上の注意 !

相談すること



1 次の人は、使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人…はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人…緑内障

2 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

- (2) 目のかすみが改善されない場合

- (3) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

- 目の疲れ
- 目のかすみ(目やにの多いときなど)
- 結膜充血
- 眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)

- 眼瞼炎(まぶたのただれ)
- 目のかゆみ
- 紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)
- ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1回2~3滴、1日5~6回点眼してください。

用法・用量に関する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる。また、混濁したものは使用しないでください。〕
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。



目やまつ毛がふれることのないように

成 分

有効成分	配合量	作用
酢酸d- α -トコフェロール (天然型ビタミンE)	0.05%	血行促進作用があり、栄養を送り届けることで疲れた目の回復を促します。
ビタミンB6	0.1%	新陳代謝促進作用があり、栄養を補給することで疲れた目の回復を促します。
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	0.1%	涙液の成分を補給し、乾いて疲れた目に効果をあらわします。
L-アスパラギン酸 カリウム	1%	目の細胞呼吸を活性化し、疲れ目に効果をあらわします。
ネオスチグミン メチル硫酸塩	0.005%	目の調節神経に作用して、ピント調節をスムーズにし、目の疲れに効果をあらわします。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	0.03%	抗ヒスタミン作用で、充血やかゆみなどの不快な症状を改善します。

*添加物として、ホウ酸、ホウ砂、 ℓ -メントール、d-ボルネオール、ユーカリ油、エドト酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40°C以上)に放置しないでください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6)保存の状態によっては、水滴や成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとてご使用ください。
- (7)容器に他の物を入れて使用しないでください。

〔捨て方〕目薬液が残った場合はティッシュ等に染みこませ、処分してください。容器はプラスチックゴミとして各自治体の廃棄方法に従い処分してください。



お問い合わせ先:お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230
受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)