

服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:パンシロンキュアSP 胃腸薬

サッと溶けて、胃酸に速攻

(速効性制酸剤配合)

パンシロン[®] キュア

第2類医薬品

胃痛・胃酸逆流 などによる胸やけに

食前の空腹時にも、食後にも飲める

製品の特徴

胸やけ・こみあげる吐き気
それって胃酸の逆流が
原因かも!?

胃酸が出過ぎると胃の痛みが生じたり、胃酸が逆流して胸やけやむかつきが生じやすくなります。「パンシロンキュアSP」は胃酸をコントロールし、胃酸から胃を守りながら痛み・胸やけを和らげる胃腸薬です。

② 中和作用

すでに出てしまっている胃酸を中和して、胃酸の攻撃力を弱めます。
速効性制酸剤と持続性制酸剤配合。

① 胃酸分泌抑制作用

胃酸分泌を促進するスイッチをブロックします。
(M1 ブロッカー)

③ 胃粘膜の保護作用

荒れた胃粘膜を修復・保護します。

＋さらに！

健胃生薬「チンピ末」配合で、弱った胃の働きを高めます。

胃痛・胸やけに**トリプルアクション[®]**が効く!



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 透析療法を受けている人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。

胃腸鎮痛鎮痙薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。

(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある)

4. 長期連用しないこと。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 授乳中の人
- (3) 高齢者
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5) 次の症状のある人
排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人
緑内障、腎臓病、甲状腺機能障害

- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気、胃部膨満感 |
| 循環器 | 動悸 |
| 泌尿器 | 排尿困難 |
| その他 | 目のかすみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-------------|---|
| アナフィラキシー様症状 | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる |

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
便秘、下痢、口のかわき
- 4.2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

■効能・効果

胃痛、胸やけ、胃酸過多、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)

■用法・用量

次の量を食前又は食後に水又はお湯で服用すること。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-------|---------|--------|
| 15才以上 | 1包 | 3回 |
| 15才未満 | 服用しないこと | |

(用法・用量に関連する注意)

用法・用量を厳守すること。

■成分・分量(3包中)

| 有効成分 | 配合量 |
|--------------|--------|
| 水酸化マグネシウム | 450mg |
| 沈降炭酸カルシウム | 900mg |
| 合成ヒドロタルサイト | 780mg |
| 炭酸水素ナトリウム | 240mg |
| ピレンゼピン塩酸塩水和物 | 46.9mg |
| チンピ末 | 300mg |
| アルジオキサ | 150mg |

添加物として、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、L-アルギニン、キシリトール、軽質無水ケイ酸、 ℓ -メントール、アスパルテム(L-フェニルアラニン化合物)、香料を含有する。

■保管及び取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

O-ト製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1