

箱内側及び外側の説明書きを必ずお読みください

なみだロート®ファイブ

LUBRICANT EYE DROPS


販売名: なみだロートファイブ 第3類医薬品 目薬 副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

なみだに近い処方ですやさしく瞳をうるおす

なみだロート®ファイブ

防腐剤
無添加*

裸眼でも
コンタクトでも



人工涙液型点眼薬

開栓後、14日を過ぎたものは使用しないでください

※防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン)を配合していません

第3類医薬品 目の乾き・疲れに

乾いた瞳、ゴロゴロ不快な瞳に
なみだに近い処方の
うるおいを

瞳にしみない
やさしい
さし心地

防腐剤
無添加*

小さな
お子さまにも*

人工涙液型点眼薬

開栓後、14日を過ぎたものは
使用しないでください

① 押してあける

清涼感レベル

なし 1 2 3 4 5
低 高



裸眼時と、すべてのコンタクトレンズ
装着中に使えます

コンタクトレンズは眼科医の処方・定期検査を受けて使用すること

裸眼

ハード
O₂(酸素透過性)
レンズを含む

ソフト
使い捨てを含む

カラーコンタクト
サークルレンズを含む

※防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン)を配合していません *1歳以上

【ご注意】1.次の方は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3)次の症状のある人:はげしい目の痛み (4)次の診断を受けた人:緑内障 2.使用に際しては、箱の内側及び外側の説明書きをよくお読みください。3.直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

【有効成分】塩化カリウム0.1%、塩化ナトリウム0.4%

【添加物】ホウ酸、pH調節剤

【効能・効果】ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

【用法・用量】1回1~3滴、1日5~6回点眼してください。

お客さま安心サポートデスク

東京:03-5442-6020

大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

↓ 使用前に、この箱内側及び外側の説明書きを必ずお読み
ください。また、必要な時に読めるよう保管してください。 ↓

販売名：なみだロートファイブ

第3類医薬品 目薬

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3) 次の症状のある人…はげしい目の痛み(4) 次の診断を受けた人…緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 目のかすみ改善されない場合(2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

用法・用量 1回1～3滴、1日5～6回点眼してください。

● **用法・用量に関する注意** (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないこと。[汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因となる]また、混濁したものは使用しないこと。(3) 点眼用にのみ使用すること。(4) コンタクトレンズを装着していないときも使用できる。(5) 開栓後、14日を過ぎたものは使用しないこと。

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど高温の場所(40℃以上)に放置しないこと。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 他の人と共用しないこと。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後はなるべく早く使用し、開栓後、14日を過ぎたものは使用しないこと。(6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがある。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとって使用すること。(7) 容器に他の物を入れて使用しないこと。