

お問合せ先

あなたのお声におこたえします。
コミュニケーションコール(お客様相談室)
0120-610-755

受付時間/9:00~17:00(土、日、祝除く)



ココロもカラダも
地球も健康に

本製品には、
環境に配慮した資材を
使用しています。

-----切り取り線-----
服用前に、このパウチの説明書きをよく読むこと。 吸湿しないように、服用のつどチャックをしっかりと閉めること **胃腸薬**

【効能・効果】胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと：透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと：胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある)
4. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5) 次の症状のある人：排尿困難 (6) 次の診断を受けた人：腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること：口のかわき
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意 母乳が出にくくなることもある。

【用法・用量】 次の量を1日3回食後又は食間・就寝前に、水又はお湯で服用すること。

15才以上…1回3錠、11才以上15才未満…1回2錠、11才未満…服用しないこと ※食間とは、食後2～3時間を指す。 <用法・用量に関連する注意> (1) 用法・用量を厳守すること。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 (9錠中) L-グルタミン 405mg、アルジオキサ 150mg、カンゾウ末 225mg、ケイヒ末 435mg、ニンジン末 225mg、炭酸水素ナトリウム 1,800mg、炭酸マグネシウム 450mg、沈降炭酸カルシウム 240mg、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 240mg、ロートエキス 30mg、ピオヂアスターゼ 2000 90mg、プロザイム6 15mg、リパーゼAP6 60mg。 添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、ℓ-メントール、ハッカ油、D-マンニトール、ステアリン酸マグネシウムを含む。

【保管及び取扱上の注意】 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 湿気により錠剤の表面が変色することがあるので、ぬれた手で触れないこと。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。

使用
期限

製造
番号

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

ロート製薬株式会社 大阪市生野区巽西1-8-1
お問合せ先：0120-610-755



401199103