

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

制酸薬

第3類医薬品

日本薬局方

炭酸水素ナトリウム

(重曹)

Sodium Bicarbonate

3g×12包

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 腎臓病の診断を受けた人。
- 2週間位服用しても症状がよくなる場合、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能効果〕

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲みすぎ、胃

〔保管及び取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

〈貯法〉

気密容器。室温保存。

痛

〔用法用量〕

大人（15歳以上）1回1/3包を1日
3回食前又は食間に服用してください。

〈用法用量に関連する注意〉

用法用量を厳守してください。

〔成分分量〕 1包（1日量）中

日局炭酸水素ナトリウム 3g含有

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）



箱 分包：PE,セロハン