

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

制酸薬

第3類医薬品

日本薬局方

炭酸水素ナトリウム

(重曹)

Sodium Bicarbonate

3g×12包



使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 腎臓病の診断を受けた人。
2. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心）、嘔吐、飲みすぎ、胃

（保管及び取扱い上の注意）

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

貯法

気密容器。室温保存。

痛

(用法用量)

大人(15歳以上) 1回1/3包を1日
3回食前又は食間に服用してください。

<用法用量に関連する注意>

用法用量を厳守してください。

(成分分量) 1包(1日量) 中

日局炭酸水素ナトリウム 3g含有

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



箱 分包 : PE, セロハン