

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

第2類医薬品

# ガストール<sup>®</sup>細粒

胃腸薬 M<sub>1</sub>ブロッカー配合

- 胃酸は食物の消化に必要なものですが、ストレスや飲み過ぎなどにより必要以上に分泌されると、胃粘膜を攻撃し、胃痛・胸やけ・むかつき・胃もたれなどのつらい胃の症状を引き起こします。
- ガストール細粒は、M<sub>1</sub>ブロッカーと制酸剤を配合。制酸剤が出過ぎてしまった胃酸を中和、そして、M<sub>1</sub>ブロッカーが過剰な胃酸分泌を抑制することで、つらい胃の症状に優れた効果を発揮します。

## ⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- ① 次の人は服用しないでください  
(1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(2) 透析療法を受けている人。
- ② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
胃腸鎮痛鎮痙薬、乗物酔い薬
- ③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
- ④ 長期連用しないでください



## 相談すること

- ① 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 授乳中の人。  
(3) 高齢者。  
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。  
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6) 次の症状のある人。 排尿困難  
(7) 次の診断を受けた人。 緑内障、腎臓病
- ② 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。



| 関係部位 | 症状            |
|------|---------------|
| 皮ふ   | 発疹・発赤、かゆみ     |
| 消化器  | はきけ、胃部膨満感     |
| その他  | 排尿困難、動悸、目のかすみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称       | 症状                        |
|-------------|---------------------------|
| アナフィラキシー様症状 | 胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹等があらわれる。 |

- (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合。
- ③ 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
便秘、下痢、口のかわき

## 効能・効果

- 胃痛、胸やけ、胃酸過多、胸つかえ、げっぷ
- 胃もたれ、胃重、胃部不快感、胃部膨満感
- はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲みすぎ
- 食べすぎ、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進、食欲不振

## 用法・用量

次の1回量を1日3回、毎食後に服用します。

| 年齢  | 成人(15才以上) | 15才未満    |
|-----|-----------|----------|
| 1回量 | 1包        | ×服用しないこと |

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。


## 成分と作用 3包(1日量)中

| 成分                        | 3包中                                 | 作用                    |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ピレンゼピン塩酸塩水和物<br>〈M1プロッター〉 | 47.1mg<br>(ピレンゼピン塩酸塩<br>無水物として45mg) | 出過ぎる胃酸の分泌を抑えます。       |
| メタケイ酸アルミン酸<br>マグネシウム      | 900mg                               | 胃酸を中和するとともに胃粘膜を保護します。 |
| 炭酸水素ナトリウム                 | 1,200mg                             | 胃酸をすみやかに中和します。        |
| ビオチンアスターゼ2000             | 30mg                                | 食物の消化を促します。           |

添加物として、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ステアリン酸Mg、*l*-メントールを含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限をすぎたものは服用しないでください。



|         |  |
|---------|--|
| お問い合わせ先 | お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。<br>エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193<br>受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く） |
|---------|--|

製造販売元



**エスエス製薬株式会社**

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4  
<http://www.ssp.co.jp/>

