

胃痛・腹痛に  
鎮痛鎮痙剤**ブスコパン<sup>®</sup>A錠**BUSCOPAN<sup>®</sup>-A TABLETS

胃痛・腹痛・さしこみなどの痛みは、胃腸の過度の緊張やけいれんによっておこります。ブスコパンA錠は、胃腸の異常な緊張を和らげ、胃痛・腹痛・さしこみなどの痛みにすぐれた効果をあらわします。

**⚠ 使用上の注意****⊗ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

**1. 次の人は服用しないでください**

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

**2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください**

他の胃腸薬(ロートエキスを含有する製剤)、他の胃腸鎮痛鎮痙薬、乗物酔い薬

**3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください**

(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

**相談すること****1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください**

(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)高齢者。(4)本人又は家族がアレルギー体質の人。(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6)次の症状のある人。 排尿困難 (7)次の診断を受けた人。 心臓病、緑内障

**2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください**

(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ、排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2)5~6回服用しても症状がよくなる場合。

**3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください**

便秘、口のかわき

## ■ 効能・効果

胃痛、腹痛、さしこみ（<sup>せんつう</sup>疝痛、<sup>しゃく</sup>癢）、胃酸過多、胸やけ



胃痛



腹痛

## ■ 用法・用量

次の1回量を1日3回を限度として服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	成人(15才以上)	15才未満
1回量	1錠	服用しないこと

### <用法・用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



## ■ 成 分 1錠(1回量)中

ブチルスコポラミン臭化物 ..... 10mg  
添加物として、乳糖、白糖、マクロゴール、アラビアゴム、カルナウバロウ、サラシミツロウ、ステアリン酸Mg、セラック、タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン、ラウリル硫酸Na、酒石酸を含有します。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。  
(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)  
(4)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

## ■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



**エスエス製薬株式会社**

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>



Boehringer 提携

Ingelheim 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社