

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

# エスタックイブ® FT

第②類医薬品

【かぜ薬】発熱・さむけ、つらいのどの痛みによく効く

&lt;製品特徴&gt;

- エスタックイブFTは、イブプロフェン、ショウキョウ末、ケイヒ末をはじめとする7つの成分を配合しました。発熱・さむけ、つらいのどの痛みなどのかぜの諸症状にすぐれた効果を発揮する総合かぜ薬です。
- 発汗解熱作用のあるショウキョウ末とケイヒ末を配合。抗炎症作用を有し、のどの痛みも抑える解熱鎮痛成分イブプロフェンとの働きにより「発熱・さむけ」と「つらいのどの痛み」によく効きます。
- 持ち運びに便利なP.T.P.包装です。

## ⚠ 使用上の注意

**してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

**① 次の人は服用しないでください**

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 15才未満の小児。
- 出産予定日12週以内の妊婦。

**② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください**

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等)

**③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください**

(眠気等があらわれることがあります。)

**④ 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください**

**⑤ 服用前後は飲酒しないでください**

**⑥ 5日間を超えて服用しないでください**



### 相談すること

**① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

- 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 高齢者。
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の症状のある人。高熱、排尿困難
- 次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、糖尿病、緑内障、肝臓病、腎臓病、甲状腺機能障害、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病
- 次の病気にかかったことのある人。  
胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クロhn病

**② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃痛、胃部不快感、胃もたれ、胃腸出血、胸やけ、腹痛、口内炎、下痢、血便
精神神経系	めまい
循環器	動悸
呼吸器	息切れ
泌尿器	排尿困難
その他	目のかすみ、耳なり、むくみ、鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、背中の痛み、過度の体温低下、からだがだるい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

(裏面につづく)

®: 登録商標

(表面のつづき)

症状の名称	症 状
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
無菌性髄膜炎	首すじのつっぱりを伴った激しい頭痛、発熱、吐き気・嘔吐等の症状があらわれる。（このような症状は、特に全身性エリテマトーデス又は混合性結合組織病の治療を受けている人で多く報告されている。）
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

③服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、口のかわき、眠気

④5~6回服用しても症状がよくならない場合（特に熱が3日以上続いたり、また熱が反復したりするとき）は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**効能・効果** カゼの諸症状(発熱、悪寒、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

**用法・用量** 次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	成 人(15才以上)	15才未満
1回量	2錠	×服用しないこと

**〈用法・用量に関連する注意〉**

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っている  
PTPシートの凸部を指先で強く押  
して裏面のアルミ箔を破り、取り出し

てお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



成 分	イブプロフェン	450mg
6錠(1日量)中	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg
	ジヒドロコデインリン酸塩	24mg
	d&L-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg
	無水カフェイン	75mg
	ケイヒ末	400mg
	ショウキョウ末	200mg

添加物：無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン

**保管及び取扱い上の注意**

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限をすぎたものは服用しないでください。



お問い合わせ先	お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。 エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-028-193 受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）	
---------	---	--

製造販売元



**エスエス製薬株式会社**

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>