



【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】



ハイチオール ホワイトア プレミアム®

第3類医薬品

ビタミンC主薬製剤 シミ・そばかすに

ハイチオール ホワイトア プレミアムは、

- L-システイン、ビタミンB₆、ビタミンCが、からだの内側から肌に働きかけ、シミ・そばかすなどの色素沈着を緩和します。
 - 肌の奥で増す過剰なメラニンの生成を抑制します。
 - 過剰なメラニンの蓄積を抑制します。
 - 肌の代謝を助け、メラニンのスムーズな排出を促進します。
 - 肌に沈着してしまった黒色メラニンの色を薄くします。
- 錠剤が苦手な方でも飲みやすい、小粒化を実現。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- ① 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	吐き気・嘔吐



- ② 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
- ③ 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

1. 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
2. 次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻血
「ただし、上記1及び2の症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」
3. 次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

用法・用量 次の1回量を1日2回、水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	成人(15才以上)	7才～14才	7才未満
1回量	2錠	1錠	✕服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)食前・食後にかかわらず、いつでも服用できます。
- (3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分

4錠(成人1日量)中

L-システイン・・・・・・・・・・240mg
アスコルビン酸(ビタミンC)・・・・・・・・・・500mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)・・・・・・・・・・50mg

添加物：無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、D-マンニトール、ケイ酸Al/K、ジメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、ステアリン酸Ca、タルク、酸化チタン、トウモロコシデンプン、酒石酸

- 本剤の服用により、尿及び大便の検査値が影響を受けることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを服用していることを医師にお知らせください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)ピンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。
- (5)ピンの中のつめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6)使用期限をすぎたものは服用しないでください。



お問い合わせ先

お問い合わせ先 **お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。**
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 電話 0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

