

服用に際しては、説明書きをよく読んでください。

滋養強壮・栄養補給

リポビタンDハイパー

販売名：リポビタン DK

指定医薬部外品

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合。
皮ふ：発疹／消化器：胃部不快感
 - (2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。
2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
下痢

【効 能】

☆肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の
栄養補給 ☆滋養強壮 ☆虚弱体質

【用法・用量】

成人（15才以上）1日1回1本（100mL）を服用してください。

※15才未満は服用しないでください。

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。（他のビタミン等を含有する製剤を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください）
- (2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

【成 分】 100mL 中

タウリン	3000mg
ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン	20mg
ローヤルゼリー	100mg
カルニチン塩化物	50mg
チアミン硝化物（ビタミン B ₁ ）	10mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミン B ₂ ）	5mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミン B ₆ ）	10mg
イノシトール	100mg
ニコチン酸アミド	20mg
無水カフェイン	50mg

添加物：白糖、D-ソルビトール、アセスルファムK、スクラロース、ステビア抽出精製物、クエン酸、クエン酸 Na、ポビドン、没食子酸プロピル、安息香酸 Na、カラメル、香料、グリセリン

【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミン B₂によるもので、ご心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

大正製薬株式会社¹¹

東京都豊島区高田3丁目24番1号
お客様119番室 電話03-3985-1800