

使用前に次の説明文を必ずお読みください。

つらい筋肉痛・打撲に

ジクロテクトPROスプレー

ジクロテクト PRO スプレー

〈鎮痛消炎薬〉

第2類医薬品

⚠️【使用上の注意】

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないでください
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)ぜんそくを起こしたことがある人。
(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(4)15才未満の小児。
- 次の部位には使用しないでください
(1)目の周囲、粘膜等。
(2)皮膚の弱い部位(顔、頭、わきの下等)。
(3)湿疹、かぶれ、傷口。
(4)みずむし・たむし等又は化膿している患部。
- 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください
- 長期連用しないでください

相談すること



- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)次の医薬品の投与を受けている人。
ニューキノロン系抗菌剤
- 使用中又は使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮膚のあれ、落屑(らくせつ)(フケ、アカのような皮膚のはがれ)、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮膚炎、 光線過敏症	塗布部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身にひろがる場合があります。また、日光があたった部位に症状があらわれたり、悪化することがあります。

- 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能】

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫

【用法・用量】

1日3～4回適量を患部に噴射塗布してください。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

【注意】

よく振ってお使いください。

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は、痛みやはれ等の原因となっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3)1週間あたり原液として50g（8日間で本剤1本）を超えて使用しないでください。
- (4)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5)使用部位に他の外用剤を併用しないでください。
- (6)顔に向けて噴射しないでください。
- (7)大量・広範囲には使用しないでください。
- (8)外用にのみ使用し、吸入しないでください。吸入によりめまい、吐き気等の症状を起こすことがあるので、できるだけ吸入しないよう、また周囲の人にも十分注意して使用してください。
- (9)使用前によく振とうし、真下に向けて噴射してください。
- (10)患部まで約10cmの距離で噴射してください。
- (11)同じ箇所に連続して3秒以上噴射しないでください。
- (12)通気性の悪いもの（ラップフィルム、矯正ベルト等）で使用部位を覆い、密封状態にしないでください。

【成分】原液 100g 中

ジクロフェナクナトリウム…………… 1.0g

l-メントール…………… 3.0g

添加物：アジピン酸ジイソプロピル、乳酸、プロピレングリコール、ポリソルベート 80、エタノール、DME、LPG

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)火気に近づけないでください。
- (3)小児の手の届かない所に保管してください。
- (4)合成樹脂を軟化させたり、塗料を溶かしたり、金属を変色させるおそれがありますので、付着しないように注意してください。
- (5)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

火気と高温に注意

高压ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
 - ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
 - ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
 - ④火の中に入れていないこと。
 - ⑤使い切って捨てること。
- 高压ガス：LPG / DME

●捨てる時は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを抜いてください。

火気厳禁

第一石油類 エタノール 65.0mL

お客様 119 番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

発売元

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号
http://www.taisho.co.jp

31 製造販売元

同仁医薬化工株式会社

東京都中野区弥生町5-2-2