



sato

セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬
デリケートな部分のかゆみ・かぶれに

第2類医薬品

エンペキュア®L

- 7つの有効成分(抗ヒスタミン成分：ジフェンヒドラミン、抗炎症成分：グリチルレチン酸、殺菌成分：イソプロピルメチルフェノール、局所麻酔成分：リドカイン、かゆみ止め成分：*l*-メントール、血行促進成分：トコフェロール酢酸エステル、組織修復促進成分：パンテノール)を配合した鎮痒消炎薬です。
- 本剤にステロイド成分は配合されておりません。

®：バイエルグループの登録商標



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 湿潤やただれのひどい人。
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|--------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

[効能]

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

カンジダ症、トリコモナス症等の原因によるかゆみは本剤で治療できません。

★裏面につづく

[用法・用量]

1 日数回、適量を患部に塗布してください。

《用法・用量に関連する注意》

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は外用にのみ使用してください。

[成分・分量と働き] 100g 中

成 分	分 量	働 き
ジフェンヒドラミン	1.0 g	かゆみを鎮めます。
グリチルレチン酸	1.0 g	患部の炎症を鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.5 g	殺菌作用で、細菌の繁殖を抑えます。
リドカイン	2.0 g	局所麻酔作用でかゆみを和らげます。
ℓ-メントール	0.2 g	清涼感を与え、かゆみを鎮めます。
トコフェロール酢酸エステル	2.0 g	血行を促進し、治療を助けます。
パンテノール	1.0 g	お肌の正常な働きを助けます。

添加物として、中鎖脂肪酸トリグリセリド、イソステアリン酸、ステアリルアルコール、1,3-ブチレングリコール、ミリスチン酸オクチルドデシル、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カルボキシビニルポリマー、パラベン、エドト酸Naを含みます。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/index.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03-5412-7393
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号