

2012年10月 記載要領変更に伴う改訂

第2類  
医薬品ご使用に際して、この説明文書を必ず  
お読みください。また、必要な時読め  
るよう大切に保管してください。

やけど・ヒフ炎用薬  
**オイチミンD®**

オイチミンDは…

- デキサメタゾン配合でやけどや  
ヒフ炎、かぶれにすぐれた効き  
めがあります。
- 保護力の強い半透明の油脂性基  
剤です。



## 使用上の注意

## ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

## 1. 次の部位には使用しないでください

水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。

## 2. 顔面には、広範囲に使用しないでください

## 3. 長期連用しないでください



## 相談すること

## 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こした  
ことがある人。

(4) 患部が広範囲の人。

(5) 潤滑やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があります  
ので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又  
は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮 膚 (患 部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持 続的な刺激感

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、  
この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

## [効能]

やけど、皮膚の炎症、かぶれ、アレルギー性皮膚炎、かゆみ(皮膚瘙痒症)

## [用法・用量]

1日2~3回、患部に適量を塗布します。

## 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

## 〔成分・分量と働き〕

成 分	分 量	働 き
デキサメタゾン	0.025%	やけど、ヒフ炎の炎症やかゆみを抑えます。
トリクロロカルバニライド	0.5%	細菌による化膿を防ぎます。


添加物として、ワセリンを含有します。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



### やけどは…



◎やけどをしたときは、できるだけ早く患部を流水で冷やして、清潔に保つことが大切です。

### ヒフ炎、かぶれは…

肌が赤くはれあがり、ひりひり痛むヒフ炎にお使いください。このほか、化粧品、うるし、しらが染めなどによるかぶれにも使えます。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申しあげます。  
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口  
電話 03(5412)7393  
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元  
佐藤製薬株式会社  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号