

第3類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



しもやけ・ひび・あかぎれ用薬

# ハイスキール<sup>®</sup>

ハイスキールは…

白色～微黄白色のクリームで、しもやけ、ひび、あかぎれに効果があります。



## 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
  - (1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤・かゆみ・はれ

### [効能]

しもやけ、ひび、あかぎれ

### [用法・用量]

通常1日2～3回、患部に塗擦します。

### [用法・用量に関連する注意]

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。



## 【成分・分量と働き】

成 分	分 量	働 き
ビタミンE酢酸エステル	1.0%	末梢血管の血行をよくして、しもやけの治りを早めます。
ニコチン酸ベンジルエステル	0.02%	
ジフェンヒドラミン	1.0%	しもやけやひび、あかぎれなどのかゆみを抑えます。
グリチルリチン酸二カリウム	1.0%	しもやけやあかぎれなどの炎症を鎮めます。

添加物として、ポリオキシエチレンセチルエーテル、セタノール、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、パラベン、pH調整剤、スクワラン、ステアリン酸、ステアリン酸パチル、流動パラフィン、パラフィン、プロピレングリコール、ベヘン酸、香料(フェニルエチルアルコールを含む)を含有します。

### ◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



次のようなことがらに心がけてください。

- 1.水仕事の後は、よく水を拭きとってください。
- 2.なるべく手足を冷さないようにしてください。冷たくなった時は、よくマッサージをするなどして、血行をうながしてください。
- 3.患部にクリームを塗擦した場合には、なるべく患部を刺激から保護するため、また、クスリを長く保持するために、木綿の手袋やくつ下をご使用ください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申しあげます。  
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口  
電話 03(5412)7393  
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元  
**佐藤製薬株式会社**  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号