



セルフメディケーションをサポートします
HEALTHCARE INNOVATION

2013年9月 記載要領変更に伴う改訂

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



血行促進剤

筋肉痛・肩こり・手指の角化に



ペリドールは…

- 血行をよくして患部をあたため筋肉をほぐして、筋肉痛や肩こりに効果をあらわします。
- 血行をよくすることにより、手指の角化、しもやけに効果をあらわします。
- 気になるにおいがありません。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
出血しやすい又は出血が止まりにくい人。
2. 次の部位には使用しないでください
(1)目や目の周囲、粘膜（例えば口腔、鼻腔、脣等）等。
(2)損傷皮膚。
(3)湿疹・湿潤、かぶれ、ただれ。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)患部が顔面や広範囲の人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感、痛み、熱感、ぴりぴり感

3. 1~2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効能〕

- 筋肉痛・肩こり
- 手指の角化
- しもやけ
- 外傷(打ち身、ねんざなど)による腫れ・内出血
- やけど、けがによる傷跡

〔用法・用量〕

1日1～数回、適量を患部に塗擦するか、またはガーゼなどにのばして貼付します。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)外用のみ使用してください。
- (4)塗擦した部分をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

〔成分・分量と働き〕

成 分	分 量	働 き
ポリエチレンスルホン酸ナトリウム	1%	うっ血(血がとどこおること)をとり、血行を促進し、筋肉痛・肩こり、手指の角化などに効果をあらわします。
ニコチン酸ベンジルエステル	0.125%	吸収促進作用があり、ポリエチレンスルホン酸ナトリウムの働きを高めます。

添加物として、パラベン、ポリソルベート80、グリセリン、セタノール、ワセリンを含有します。

〈成分・分量に関する注意〉

本剤の血行促進作用により、塗擦後約10分で皮膚が赤くなったり、温く感じたりすることがありますが1～2時間位でもとに戻ります。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるものがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号