



2012年6月 記載要領変更に伴う改訂

**第2類
医薬品**

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



ビタミン含有保健薬

滋養強壮

**エンケル
黄帝L**



エンケル黄帝Lは、ニンジンやローヤルゼリーなどの生薬エキスに各種ビタミンを配合したマイルドな味の滋養強壮ドリンクです。

肉体疲労や病中病後・妊娠授乳期などの栄養補給にすぐれた効果をあらわします。



使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ



2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効能〕

- 滋養強壮
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
- 虚弱体質

〔用法・用量〕

年齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	1本(30mL)	1回
15才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守してください。

〔成分・分量と働き〕 1本(30mL)中

成分	分量	働き
シベットチンキ	250mg	ジャコウネコの腺分泌物
ゴオウチンキ	400mg	ウシの胆のう中に生じた結石
ニンジン流エキス	600mg	オタネニンジンの根
西洋サンザシ乾燥エキス	30mg	西洋サンザシの花
ジオウ乾燥エキス	120mg	アカヤジオウの根
ローヤルゼリー	150mg	ミツバチの咽頭腺でつくられる乳状物で、滋養強壮に効果をあらわします。

成分	分量	働き
ビタミンB ₁ 硝酸塩	10mg	身体の働きに欠かせないビタミン類で滋養強壮、肉体疲労・発熱性消耗性疾患時の栄養補給に効果をあらわします。
ビタミンB ₂ リン酸エステル	5mg	
ビタミンB ₆	10mg	
ビタミンE酢酸エステル	10mg	
ニコチン酸アミド	25mg	自律神経に働いて効果をあらわします。
ガンマ-オリザノール	10mg	
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	120mg	滋養強壮に効果をあらわします。
無水カフェイン	50mg	中枢神経に働いて効果をあらわします。

添加物として、白糖、*dl*-リンゴ酸、安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カラメル、pH調整剤、香料(プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリンを含む)、アルコール(0.9mL以下)を含有します。



● 人参

オタネニンジン(人参)の根を薬用とします。サポニンが主成分で滋養強壮、虚弱体質に効果があります。



● 西洋サンザシ

フラボノイドを含有し、滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給に効果をあらわします。



● 地黄

アカヤジオウ(地黄)の根。滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給に効果をあらわします。



● ローヤルゼリー

ミツバチの咽頭腺でつくられる乳状物で、アミノ酸、ビタミンを含み、滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給に効果をあらわします。

〈成分・分量に関連する注意〉

- 本剤はビタミンB₂リン酸エステルを含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。
- 本剤は生薬エキスを配合していますので、わずかに濁りを生じることがありますが、効果には変わりありません。

◎ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

ストローの添付を終了させていただきました。
(そのまま服用されても効果は変わりません。)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお問い合わせください。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号

