

ケロリン

項目	内容
医薬品区分	一般配置兼用医薬品
薬効分類	解熱鎮痛薬
承認販売名	
製品名	ケロリン
製品名（読み）	ケロリン
製品の特徴	ケロリンはアセチルサリチル酸を主成分とし、頭痛・歯痛・生理痛・神経痛などの痛みや発熱に優れた効果を発揮する解熱鎮痛薬です。 《特徴》 ●アセチルサリチル酸・無水カフェインが互いに働きあい、頭痛・歯痛・生理痛・発熱などをすみやかに和らげます。 ●のみやすい生薬（ケイヒ）配合の粉末剤で、早く溶けて優れた効果を発揮します。 ●眠くなる成分は入っていません。コンパクトな分包サイズで学校・会社・車の運転・外出先での服用にも便利です。
使用上の注意	■してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる） - 次の人は服用しないでください （1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 （2）本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 （3）15才未満の小児。 （4）出産予定日12週以内の妊婦。 - 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬 - 服用前後は飲酒しないでください - 長期連用しないでください ■相談すること - 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください （1）医師又は歯科医師の治療を受けている人。 （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。 （3）授乳中の人。 （4）高齢者。 （5）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 （6）次の診断を受けた人。 心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

	2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 〔関係部位：症状〕 皮膚：発疹・発赤、かゆみ、青あざができる 消化器：吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、腹痛、下痢、血便、胃腸出血 精神神経系：めまい その他：鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中の痛み、過度の体温低下 まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。 〔症状の名称：症状〕 ショック（アナフィラキシー）：服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）：高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。 中毒性表皮壊死融解症：高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。 アレルギー反応に伴う急性冠症候群：しめ付けられるような胸の痛み、息苦しさ、胸を強く押さえつけられた感じ、あごの痛み、左腕の痛み、さむけ、ふらつき、発汗、発熱、意識の低下、口唇周囲のはれ、かゆみ、じんましん、発疹、のどのかゆみ、動悸等があらわれる。 肝機能障害：発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 ぜんそく：息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。 再生不良性貧血：青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 3. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
効能・効果	頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛、悪寒・発熱時の解熱
効能関連注意	
用法・用量	次の1回量を1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。 〔年齢：1回量：1日服用回数〕 15才以上（大人）：1包：2回

	15才未満：服用しないこと								
用法関連注意	本剤は、定められた用法・用量を厳守してください。								
成分分量	1包(800mg)中 <table> <tr> <th>成分</th><th>分量</th></tr> <tr> <td>アセチルサリチル酸</td><td>600mg</td></tr> <tr> <td>無水カフェイン</td><td>60mg</td></tr> <tr> <td>ケイヒ末</td><td>60mg</td></tr> </table>	成分	分量	アセチルサリチル酸	600mg	無水カフェイン	60mg	ケイヒ末	60mg
成分	分量								
アセチルサリチル酸	600mg								
無水カフェイン	60mg								
ケイヒ末	60mg								
添加物	バレイショデンプン								
保管及び取扱い上の注意	(1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。 (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。 (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。） (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。								
消費者相談窓口	会社名：富山めぐみ製薬株式会社 住所：富山県富山市三番町3-10 問い合わせ先：お客様相談窓口 電話：076（421）5531 受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）								
製造販売会社	富山めぐみ製薬（株） 会社名：富山めぐみ製薬株式会社 住所：富山県富山市三番町3-10								
販売会社									
剤形	散剤								
リスク区分等	第「2」類医薬品								