

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

サリスターパップIDα

鎮痛・消炎インドメタシンパップ剤 第2類医薬品

【特徴】

- サリスターパップIDαは、有効成分インドメタシンが痛みの原因物質の生成を抑え、痛みを鎮める鎮痛・消炎インドメタシンパップ剤です。
- サリスターパップIDαは、粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用してしますので、ひじやひざにもピッタリフィットします。
- サリスターパップIDαは、基剤中の水分により、打撲、ねんざ等による熱をもった患部を心地よく冷却します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないこと

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状 |
|------|------------------------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血 |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効果・効果】

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

ライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付する。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 15歳未満の小児は使用しないこと。
- (2) 用法・用量を厳守すること。
- (3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤であるので、症状がある場合だけ使用する。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。
- (5) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。

【成分・分量】 膏体100g (1000cm²) 中

インドメタシン・・・・・・・・・・0.5g

添加物として、マクロゴール、L-メントール、酸化チタン、エドト酸Na、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、CMC-Na、グリセリン、香料、pH調節剤、その他3成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用すること。



＜包装＞ 30枚入 [6枚×5袋] (1枚サイズ: 10cm×14cm)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

＜お問い合わせ先＞

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
帝國製薬株式会社 お客様相談室
電話 (0879) 25-2363
受付時間 9:00～17:00
(土・日・祝日を除く)



製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

4 987373 077227