

ご使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

にきび、吹き出物治療薬  
**イハダ アクネキュアクリーム**

第2類医薬品



**IHADA**  
顔の肌トラブル治療薬

W効果処方

2つの有効成分が、にきび、吹き出物を効果的に治療します。

抗炎症成分

イブプロフェンピコノールが、アクネ菌によるコメドの生成を抑え、炎症を鎮めます。

殺菌成分

イソプロピルメチルフェノールが、症状を悪化させるアクネ菌などを殺菌します。



コメド: 毛穴に皮脂や角質が詰まった状態

- ノンステロイド ○お肌にやさしい弱酸性
- のびがよくべたつかないクリームタイプ ○さわやか微香性

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)  
次の部位には使用しないでください。  
目や目の周囲



### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 患部が広範囲の人
  - 湿潤やただれのひどい人
  - 深い傷やひどいやけどの人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(ヒリヒリ感)、はれ(腫脹)、乾燥化(つっぱり感)

- 1ヶ月くらい使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 〔成分・分量〕

成 分	分量(1g中)	作 用
イブプロフェンピコノール	30mg	アクネ菌によるコメドの生成を抑え、炎症を鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	3mg	症状を悪化させるアクネ菌などを殺菌します。

添加物として、ラウリン酸マクロゴール、チオ硫酸Na水和物、エデト酸Na水和物、パラベン、カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン、オクチルドデカノール、香料を含有します。

〔適応症〕 にきび、吹き出物

## 〔用法・用量〕

1日数回、石けんで洗顔後、適量を患部に塗布してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- 本剤はにきび、吹き出物のある部位のみに使用し、周辺の広い部分には使用しないでください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 本剤は外用にのみ使用してください。

## 〔保管および取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり、品質が変わる場合があります)。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後にはなるべく早く使用してください。

お問い合わせ先 資生堂薬品株式会社  
お客さま窓口 03-3573-6673 受付時間 9:30~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 資生堂薬品株式会社 東京都中央区銀座7-5-5  
製造販売元 万協製薬株式会社 三重県多気郡多気町五桂1169-142

SHISEIDO