

ひび・あかぎれ治療薬


# ケラチナミン<sup>γ</sup>ヒビエイド $\alpha$

ケラチナミン<sup>γ</sup>ヒビエイド $\alpha$ は、ひび・あかぎれの治療薬です。

## 製品特長

- 「組織修復作用」のあるアラントインとパンテノールをW配合し、できてしまったひびを修復します。
- 「組織修復サポート成分」のピリドキシン塩酸塩がひび・あかぎれの修復を助けます。
- 「血行促進作用」のあるトコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)が血行不良を改善し、ひび・あかぎれの改善を助けます。
- 「抗炎症作用」のあるグリチルレチン酸があかぎれによる炎症を抑えます。
- 「保湿作用」のあるグリセリンが、乾燥等により低下した角質層の水分を補い、ひび・あかぎれの改善を助けます。

## 〔ヒビ修復に4つの作用〕



## このような方に

- つらい「ひび」にお悩みの方に。
- つらい「あかぎれ」にお悩みの方に。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) 湿潤やただれのひどい人。
- ② 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

## 効能・効果

ひび、あかぎれ、しもやけ

## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

### <用法・用量に関連する注意>

- ①用法・用量を守ってください。
- ②小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ③目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。  
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- ④外用にのみ使用してください。

## 成分・分量 (100g中)

成分	分量	働き
アラントイン	2.0g	ひび割れた皮膚組織を修復します。
パンテノール	5.0g	皮膚組織の修復を促進します。
ピリドキシン塩酸塩	0.1g	皮膚組織の修復をサポートします。
トコフェロール酢酸エステル	2.0g	皮膚の血行を改善します。
グリチルレチン酸	0.3g	皮膚の炎症を鎮めます。
グリセリン	40.0g	皮膚を保湿し、潤いを与えます。

[添加物]ヒアルロン酸Na、ワセリン、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、ジメチルポリシロキサン、トリイソオクタン酸グリセリン、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸マクロゴール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クエン酸、クエン酸Na、パラベン

## 保管及び取扱い上の注意

- ①高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④使用期限(外箱及びチューブに記載)をすぎた製品は使用しないでください。

## 本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566  
受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00

●興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>



製造 興和株式会社  
販売元 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14