

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

痔の痛み・出血・はれ・かゆみに

# ポラギノール<sup>®</sup>プレミアム軟膏

痔疾用外用薬

第2類医薬品

## 特徴

- 6種の成分がはたらいて、痔による痛み・出血・はれ・かゆみにすぐれた効果を発揮します。
  - プレドニゾン酢酸エステルが出血、はれ、かゆみをおさえ、リドカインが痛み、かゆみをしずめ、さらにクロルフェニラミンマレイン酸塩がかゆみをしずめます。
  - イソプロピルメチルフェノールが患部を消毒し、菌の繁殖を抑えます。
  - アラントインが傷の治りをたすけ組織を修復するとともに、ビタミンE酢酸エステルが血液循環を改善し、痔の症状の緩和をたすけます。
- 使いやすさを考え、なめらかですべりのよい油性基剤を使用しています。
  - 刺激が少なく、油性基剤が傷ついた患部を保護します。
  - 白色～わずかに黄みをおびた白色の軟膏です。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

#### 1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 患部が化膿している人。

#### 2. 長期連用しないこと



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

3. 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

## 効 能


いぼ痔・きれ痔(さけ痔)の痛み・出血・はれ・かゆみの緩和および消毒

## 用法・用量

次の量を肛門部に直接塗布するか、またはガーゼなどにのぼして肛門部に貼付すること。

年 齢	1回量	1日使用回数
成人(15歳以上)	適量	1~3回
15歳未満	使用しないこと	

### チューブ穴の開け方



キャップを逆にして、キャップの突起部をチューブの先に強く押し当ててください。

(裏面へ続く)

### (用法・用量に関連する注意)

- (1) 肛門部にのみ使用すること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

### 軟膏が硬くて押し出しにくい場合

寒い時期や低温での保管により、軟膏が硬くなった場合は、チューブを手で握ってあたためると軟らかくなります。

### 成分 1g中

はたらき	成分	含量
炎症をおさえ、出血、はれ、かゆみをしずめます。	プレドニゾン酢酸エステル	1mg
局所の痛み、かゆみをしずめます。	リドカイン	30mg
局所のかゆみをしずめます。	クロルフェニラミンマレイン酸塩	2mg
患部を消毒し、菌の繁殖を抑えます。	イソプロピルメチルフェノール	1mg
傷の治りをたすけ、組織を修復します。	アラントイン	10mg
末梢の血液循環をよくし、うっ血の改善をたすけます。	ビタミンE酢酸エステル (トコフェロール酢酸エステル)	30mg

添加物：白色ワセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、モノステアリン酸グリセリン、軽質無水ケイ酸

### 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
- (5)本剤は油脂性の軟膏であるため、衣類などに付着すると取れにくくなることがあるため注意すること。
- (6)チューブを繰り返し折り曲げないこと(破れの原因となる)。

### 包装 20g (チューブ入)

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

天藤製薬株式会社「お客様相談係」

〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町一丁目5番3号 ☎ 0120-932-904

受付時間：9：00～17：00 (土、日、休、祝日を除く)

製造販売元 <sup>あま</sup> <sup>とう</sup> 天藤製薬株式会社

〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町一丁目5番3号