2012年10月
(記載要領変更に伴う改訂)
漢方製剤
第2類医薬品

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

ツムラの漢方製剤
ツムラ漢方荊芥連翹湯エキス顆粒

「荊芥連翹湯」は、『一貫堂』という漢方医学の一派が経験に基づき処方した漢方薬で、「蓄膿症」、「慢性鼻炎」、「慢性扁桃炎」、「にきび」に用いられています。『ツムラ漢方荊芥連翹湯エキス顆粒』は、「荊芥連翹湯」から抽出したエキスより製した服用しやすい顆粒です。

⚠使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
   (1) 医師の治療を受けている人。
   (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
   (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症　状
皮　　膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症　状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

●効能・効果

体力中等度以上で、皮膚の色が浅黒く、ときに手足の裏に脂汗をかきやすく腹壁が緊張しているものの次の諸症：
蓄膿症（副鼻腔炎）、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび

●用法・用量

次の量を、食前に水またはお湯で服用してください。

年　齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包(1.875g)	2回
7歳以上15歳未満	2／3包	
4歳以上　7歳未満	1／2包	
2歳以上　4歳未満	1／3包	
2歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

●成分・分量

本品2包(3.75g)中、下記の割合の混合生薬の乾燥エキス2.25gを含有します。

日局オウゴン…… 0.75g　日局シャクヤク…… 0.75g
日局オウバク…… 0.75g　日局センキュウ…… 0.75g
日局オウレン…… 0.75g　日局トウキ…… 0.75g
日局キキョウ…… 0.75g　日局ハッカ…… 0.75g
日局キジツ…… 0.75g　日局ビャクシ…… 0.75g
日局ケイガイ…… 0.75g　日局ボウフウ…… 0.75g
日局サイコ…… 0.75g　日局レンギョウ…… 0.75g
日局サンシシ…… 0.75g　日局カンゾウ……0.5g
日局ジオウ…… 0.75g

添加物として日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物を含有します。

●保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
4. 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を用いた製品ですので、製品により多少顆粒の色調等が異なることがありますが効能・効果にはかわりありません。
5. 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

お問い合わせ先

本製品内容について、何かお気付きの点がございましたら、
お買求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

製造販売元

株式会社ツムラ
東京都港区赤坂2-17-11
〒107-8521

お客様相談窓口
電　話　0120-329-930
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)
http://www.tsumura.co.jp/