

この説明書は、使用前によくお読みください。
なお、使用が終わるまで大切に保管してください。

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去 [第3類医薬品]

コデトンうがい薬

コデトンうがい薬は、さまざまな細菌やウイルスに対して殺菌作用をもった「ポビドンヨード」を有効成分とする製剤で、のどの殺菌・消毒・洗浄ならびに口臭を除去することができるうがい薬です。

[特徴]

- ・コデトンうがい薬は、口腔内のさまざまな細菌に対し強い殺菌作用があります。
- ・コデトンうがい薬によるうがいは、口腔内の細菌を洗浄し、細菌に侵された患部を消毒します。
- ・コデトンうがい薬は、口臭や口内の不快感をとり去ります。
- ・コデトンうがい薬は、口内の粘膜を刺激せず、使用後はさわやかです。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 本剤又はヨウ素に対して過敏症の既往歴のある人。
- 次の症状のある人。

口内のひどいだれ、甲状腺の疾患

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- 使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|------|----------------|
| 口 | あれ、しみる、灼熱感、刺激感 |
| 消化器 | 恶心 |
| その他の | 不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|--------------------|--|
| ショック (アナフィラキシー) | 使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。 |
| アナフィラキシー様症状 | 胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹等があらわれる。 |

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【用法・用量】


1回、本剤2～4mLを水約60mLにうすめて、1日数回うがいしてください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
うがい液をはきだせない年齢の小児には使用させないでください。
- (3) うがい用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 本剤は使用する時にのみ希釈し、うすめた液は、早めに使用してください。
- (5) 使用法

うがいの仕方

キャップをあけて容器をさかさまに持ち、指でゆっくり押して本剤2～4mL(添付の計量コップを斜めにして、2～4目盛)をとり、約60mL(計量コップを水平にもどし60目盛)の水でうすめて、ていねいにうがいしてください。



【成分・分量】

1mL中 ポビドンヨード 70mg

(有効ヨウ素7mg含有)

添加物として、ヨウ化K、l-メントール、D-ソルビトール液、サッカリンナトリウム水和物、グリセリン、アルコールを含有します。

〈成分・分量に関する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 薬液が衣類に付着した時は、すぐに水または洗剤で洗ってください。落ちにくい場合にはチオ硫酸ナトリウム(ハイポ)で洗ってください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- (6) 添付の目盛り付きコップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。

本剤をご使用になられて、何かお気付きの点がございましたら、
下記までご連絡頂きますようお願い致します。

福地製薬株式会社

T E L : 0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 福地製薬株式会社
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824